

# Avertissements agricoles



BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT  
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
RHÔNE-ALPES

## Grandes Cultures

165, rue Garibaldi - Bâtiment B - B.P. 3202 - 69401 LYON Cédex 03 ☎ 78.63.25.65

ABONNEMENT ANNUEL : 150 F - Régisseur Recettes DRAF

Bulletin n° 1 - 22 Février 1989

### CHARANCON DE LA TIGE DU COLZA


#### Situation

Les conditions climatiques de cet hiver, bien voisines de celles de l'hiver dernier ont amené une évolution de la végétation et des parasites également bien voisines.

C'est ainsi que le premier vol important du charançon de la tige a été constaté en zones précoces et moyennes le 19 Février à l'occasion d'une journée particulièrement clémente.



C<sub>2</sub> Entre-nœuds visibles. On voit un étranglement vert clair à la base des nouveaux pétioles : c'est la tige.



Ce vol arrive sur une végétation ayant déjà atteint le stade C<sub>2</sub>, donc réceptive à ses attaques.

#### Préconisation

L'intervention est à effectuer dès que possible, par beau temps calme et aux heures chaudes de la journée en utilisant l'un des produits homologués suivants (en g de ma/ha) :

- alphaméthrine (FASTAC) : 7,5	- endosulfan (nb spéc) : 400
- biphenthrine (TALSTAR) : 7,5	- gamma HCH (lindane) ( " " ) : 300
- cyfluthrine (BAYTHROID) : 15	- méthidathion ( " " ) : 300
- cyhalothrine (KARATE) : 7,5	- parathion éthyl ( " " ) : 300
- deltaméthrine (DECIS) : 7,5	- parathion méthyl ( " " ) : 300
- cyperméthrine (nb spéc.) : 25	

et leurs associations diverses ou huileuses.

- Montaison

(1489)

up 11

P. 196

40 60 41 527

1489. v 1-19

En cas de rafraîchissement des températures et si le piège n'a pas été encore placé, on peut toujours contrôler le vol soit en mettant le piège en place (il est encore tôt en saison et d'autres vols peuvent avoir lieu), soit par l'observation des pontes (1 par plante en moyenne sur 50 plantes amène une décision de traitement).

#### GROSSE ALTISE ET CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL


L'insignifiante attaque d'adultes cet automne laissait penser à une absence de larves à la sortie de l'hiver.

Cependant, il a été constaté la présence de parcelles infestées dans la région de St Marcellin. Comme indiqué sur le précédent Bulletin, un traitement peut encore se justifier lorsque plus de 2 pieds sur 3 sont contaminés. Le produit à employer est l'oléoparathion en évitant le mélange avec un herbicide et en opérant par température supérieure à + 5° C.

#### AVIS AUX ABONNES

Le coupon d'abonnement a été envoyé avec le Bulletin précédent, n'oubliez pas de vous réabonner pour éviter une interruption de votre abonnement. Ceci ne concerne donc pas les personnes abonnées par des Coopératives ou des Sociétés ainsi que nos observateurs ou correspondants.

Un lot de plaquettes maïs 1988 étant disponible, il pourra être envoyé gratuitement aux premiers abonnés jusqu'à limite du stock.



Le service de la protection des végétaux et le journal  
"LA FRANCE AGRICOLE" s'unissent pour vous proposer :

**Les Avertissements Agricoles sur Minitel**  
**36.15 code FA3**

- Grandes cultures  
- Arboriculture  
- Viticulture

PVRACULT  
PVRAARBO  
PVRAVITI

**la France  
agricole**